

Brote de enfermedad de manos, pies y boca.

Conoce sus síntomas y qué hacer.

El tratamiento presenta altísimas probabilidades de evitar un cáncer potencialmente mortal. Sin embargo, las tasas de vacunación en países como EEUU siguen siendo insuficientes. Parece que parte del problema es no querer asumir que los adolescentes puedan mantener relaciones sexuales.



Déjanos Cuidarte



Usar preservativo



Vacúnate
contra el
VPH



Realiza tu
prueba de
Papanicolaou



UNA VIDA
PLENA

TEST
TIANGUISTENCO



Yo me vacuné
contra el **VPH**
vacúnate tú también

María cristina Hernández Acosta
Encargada del Área Médica

TEL. (01713) 1350900 EXT. 177

Correo Electrónico

areatest.medi@gmail.com


**TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUERIORES DE
TIANGUISTENCO.**



TEST

TEST
TIANGUISTENCO

La vacuna contra el VPH:
guerra entre los expertos y
los padres que no quieren
hablar de sexo



VPH son las siglas para referirse al virus de papiloma humano (o HPV en inglés).

Los VPH son un grupo de más de 150 virus relacionados.

A cada variedad de VPH en el grupo se le asigna un número, y se le llama un tipo de VPH .

El VPH-16 y el VPH-18. Estos dos tipos son causantes del 70% de todos los casos de precáncer y cáncer de cuello uterino

VPH

¿Puede una vacuna ayudar a prevenir el VPH?

¿Quién debe vacunarse contra el VPH?



Todas las personas de entre 9 y 26 años pueden vacunarse contra el VPH para protegerse contra las verrugas genitales o los diferentes tipos del VPH que pueden provocar cáncer. Se recomienda que los niños se vacunen a la edad de 11 o 12 años, para que estén completamente protegidos años antes de convertirse en personas sexualmente activas.

Los estudios demuestran que la vacuna contra el VPH no lleva a las personas a tener más sexo o a tener relaciones sexuales a una edad más temprana. Por lo tanto, la aplicación de la vacuna contra el VPH no alienta a los niños a tener sexo. Lo único que hace es brindarles protección contra las verrugas genitales y el cáncer cuando sean adultos.

Hay vacunas disponibles que ayudan a prevenir la infección por ciertos tipos de VPH y algunas de las formas de cáncer que están relacionadas con estos tipos del virus. Gardasil , Gardasil 9 y Cervarix son los nombres de marca de las vacunas utilizadas hoy en día.

El VPH de alto riesgo no presenta síntomas.

Lamentablemente, la mayoría de las personas que tienen un tipo de VPH de alto riesgo no muestran signos de la infección hasta que ya ha causado graves problemas de salud. Es por eso que los chequeos regulares son tan importantes. En muchos casos, el cáncer cervical se puede prevenir al detectar cambios anormales en las células que, de no tratarse, pueden convertirse en cáncer.

La prueba de Papanicolaou, conocida comúnmente como citología vaginal, sirve para detectar estas células anormales en el cuello uterino. La citología vaginal puede detectar células anormales en tu cuello uterino. Esta no es una prueba que detecta cáncer o el VPH de forma directa, pero puede descubrir cambios anormales en las células que seguramente son causados por el VPH .

Las infecciones genitales por VPH se transmiten principalmente por vía sexual, y en particular, aunque no exclusivamente, por las relaciones sexuales con penetración.

Los VPH son llamados virus del papiloma debido a que algunos tipos de VPH causan verrugas o papilomas que son tumores no cancerosos. Sin embargo, se sabe que algunos tipos de VPH causan cáncer.

El VPH causa la mayoría de los casos de cáncer de cuello uterino, así como muchos cánceres de vagina, vulva, ano, pene y orofaringe (cáncer de la garganta y la lengua).

